

Raskaudenkeskeytys

Tarvittavat asiakirjat täytetään lääkärin vastaanotolla ja lääkäri tekee lähetteen sairaalaan. Ensimmäisellä käynnillä sairaalassa varmistetaan raskauden kesto ultraäänitutkimuksella ja päätetään keskeytysaikataulu ja -menetelmä.

Käännä rohkeasti henkilökunnan puoleen, jos sinulla on kysyttävää prosessista tai jos epäröit päätöstäsi.

Lääkkeellinen raskaudenkeskeytys, alle 12 raskausviikkoa

- Keskeytyksessä käytetään kahta lääkettä (mifepristoni ja misoprostoli).
- Keskeytys voidaan toteuttaa myös osittain kotona. Saat ensimmäisen lääkkeen naistentautien poliklinikalla ja toisen saat mukaasi kotona otettavaksi. Kotona on oltava täysi-ikäinen tukihenkilö läsnä.
- Poliklinikkakäyntejä on 1 – 2 ja käynnit ovat maksullisia.
- Keskeytyksen jälkeen sairaalasta kotiutuessa pitää mukana olla täysi-ikäinen saattaja.

Kirurginen raskaudenkeskeytys (imukaavinta), alle 12 raskausviikkoa

- Kohtuontelo tyhjenetään imukaavinnalla. Toimenpide tehdään nukutuksessa.
- Kotiin pääsee muutaman tunnin seurannan jälkeen täysi-ikäisen saattajan kanssa.
- Toimenpide on maksullinen.

Mikäli raskausviikkoja on yli 12

- Keskeytyslupa anotaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (VALVIRA).
- Tarvittavat asiakirjat ja lähete sairaalaan laaditaan lääkärin vastaanotolla.
- Keskeytys aloitetaan lääkkeillä ja tarvittaessa tehdään myös imukaavinta.
- Osastohoito kestää 1 - 3 päivää.
- Keskeytyksen hinta vaihtelee riippuen tarvittavista toimenpiteistä ja osastoseurannan pituudesta.

Raskaudenkeskeytyksen jälkeen

- Raskaudenehkäisy aloitetaan heti toimenpiteen jälkeen.
- Jälkivuoto voi kestää 1 - 4 viikkoa ja sairauslomaa tarvitaan yleensä kolme päivää.
- Keskeytyksen onnistuminen täytyy varmistaa verikokeesta tehtävällä raskaustestillä kolmen viikon kuluttua keskeytyksestä. Saat lähetteen ja ohjeet toimenpideyksiköstä.
- Varaa jälkitarkastusaika saamiesi ohjeiden mukaan. Muista käydä verikokeessa ennen tarkastusta.
- Jälkitarkastuksessa varmistetaan ehkäisymenetelmän sopivuus, ja arvioidaan sosiaalisen ja psyykkisen tuen tarve

Lisätietoja

Käypä hoito- suosituksen potilasversio raskaudenkeskeytyksestä www.kaypahoito.fi