


1. Asteen sukulaisen syvän laskimotukoksen (SLT) tai keuhkoembolian (KE) vaikutus yhdistelmäehkäisyn aloittamiseen ja tukostaipumustutkimuksiin



Hormonaalisen ehkäisyn aloitukseen liittyen tukostaipumustutkimukset on tarpeen tehdä vain, jos ensimmäisen asteen sukulaisella on tunnettu tukostaipumus. Tällöin tutkitaan **ainoastaan** sukulaisella todettu tekijä.

* Tukostaipumustutkimukset voidaan tehdä harkinnan mukaan raskauden suunnittelu- tai alkuvaiheessa.

1. Medical eligibility criteria (MEC) http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/181468/1/9789241549158_eng.pdf (SIVU 117)
2. Raskauden ehkäisyn Käypä hoito-suositus <http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suosituksset/suositus?id=hoi50104> (TAULUKKO 2)
3. Työryhmä 11.10.2017 Tampere
LT, prof. Risto Kaaja, LT, dos. Pirjo Mustonen, LT Päivi Galambosi, LL Kirsi Väyrynen, LL Noora Seilo, LL Susanna Paldanius
4. Lääkärin käsikirja: Tukostaipumuksen (trombofilian) selvittely laboratoriotutkimuksella. Mustonen, Pirjo. 30.6.2016.
5. Connors J.M. Thrombophilia Testing and Venous Thrombosis. N Engl J Med 2017; 377:1177-1187.